

CUIDADOS COM RECÉM- NASCIDOS E CRIANÇAS . CORONAVÍRUS . (COVID- 19)



CORONAVÍRUS



- O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, semelhantes à gripe;
- O novo coronavírus, que surgiu em dezembro de 2019 na China, provoca a doença denominada de COVID-19;
- O número de pessoas infectadas por esse vírus tem aumentado em todo o mundo, assim como o número de mortes provocadas pela doença, o que torna necessário que cada um siga as medidas de prevenção, higienização e isolamento social;

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



- **PERÍODO DE INCUBAÇÃO:** É o tempo que vai do momento em que a pessoa entrou em contato com o vírus até surgirem os primeiros sintomas;

**PERÍODO DE INCUBAÇÃO DO CORONAVÍRUS:
5 DIAS A 2 SEMANAS**

- **MODO DE TRANSMISSÃO:** Como uma pessoa pode adquirir a doença?
 - ✓ Objetos ou Superfícies Contaminados;
 - ✓ Gotas de Saliva;
 - ✓ Aperto de Mão;
 - ✓ Espirro;

CRIANÇAS E O RISCO DE ADOECEREM



- Crianças são tão propensas a se infectarem quanto os adultos. A diferença é que elas apresentam menos sintomas e também um menor risco desenvolver a doença de forma grave.
- Mesmo assim, é importante manter as medidas de prevenção para que elas não transmitam a doença para outras pessoas, principalmente aquelas que vivem na mesma casa.

SINTOMAS DA INFECÇÃO EM CRIANÇAS



TOSSE

FEBRE

DIARREIA

VÔMITO

NARIZ ENTUPIDO

DOR NA GARGANTA

DOR DE CABEÇA

**LEMBRE-SE: MUITAS VEZES A CRIANÇA PODE
NÃO APRESENTAR SINTOMAS!**

SINTOMAS DE ALERTA



**NA PRESENÇA DE QUALQUER SINAL DE ALERTA ABAIXO
A CRIANÇA DEVE SER LEVADA IMEDIATAMENTE AO
HOSPITAL**



GERAIS

- Dificuldade de respirar;
- Febre ou vômito persistente;
- Criança não parece estar bem;
- Recusa a se alimentar/ amamentar
- Episódio de convulsão
- Criança prostrada ou inconsciente;
- Presença de gemido constante;



SINAIS DE GRAVIDADE EM CRIANÇA COM TOSSE:

- Respiração rápida;
- Falta de ar;
- Ruídos no peito;
- Afundamento da pele das costas ao respirar;



SINAIS DE GRAVIDADE EM CRIANÇA COM DESNUTRIÇÃO OU ANEMIA:

- Perda importante de peso;
- Inchaço dos pés e barriga;
- Palidez generalizada;



SINAIS DE GRAVIDADE EM CRIANÇAS COM DIARREIA

- Olhos fundos;
- Boca seca e muita sede;
- Sonolência aumentada;



SINAIS DE PERIGO EM CRIANÇAS COM FEBRE

- Febre prolongada por 5 dias, sem melhora;
- Manifestações de sangramento (pontos vermelhos na pele, presença de sangue na gengiva, nariz, fezes ou vômito);
- Manchas na pele, acompanhado ou não de tosse e vermelhidão nos olhos

FATORES DE RISCO PARA MAIOR GRAVIDADE



- Crianças menores de 2 anos, com doenças pulmonares crônicas, como asma e fibrose cística, diabetes mellitus, insuficiência renal e imunossupressão têm maior chance de desenvolver o quadro grave pelo novo coronavírus.

IMUNIZAÇÃO



O CALENDÁRIO VACINAL DEVE SER MANTIDO SEMPRE ATUALIZADO!

COMO PROTEGER RECÉM- NASCIDOS E CRIANÇAS?



HIGIENIZAR AS MÃOS PREFERENCIALMENTE COM ÁGUA E SABÃO. QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL, UTILIZE ÁLCOOL A 70%

ENSINAR A CRIANÇA A SEMPRE LAVAR AS MÃOS QUANDO TOSSIR OU ESPIRRAR

**ORIENTAR A CRIANÇA A EVITAR TOCAR O ROSTO,
PRINCIPALMENTE A BOCA**

**EVITAR O CONTATO COM AS PESSOAS QUE APRESENTEM
ALGUM DOS SINTOMAS**

MANTER AS SUPERFÍCIES DA CASA LIMPAS DIARIAMENTE

**MANTER OS AMBIENTES BEM VENTILADOS, COM AS JANELAS
ABERTAS**

LAVAR OBJETOS E BRINQUEDOS

**EVITAR LOCAIS PÚBLICOS, VIAGENS E CONTATO COM
OUTRAS CRIANÇAS**

PERMANECER EM CASA O MÁXIMO POSSÍVEL

QUANDO NECESSÁRIO SAIR DE CASA, UTILIZE MÁSCARA

CUIDADOS COM A AMAMENTAÇÃO



- Ainda não se sabe certamente se a mãe que esteja com COVID- 19 pode transmitir o virus para o filho através do leite materno. No entanto, algumas medidas devem ser seguidas para evitar a infecção do recém- nascido:

**LAVAR BEM AS MÃOS ANTES DE TOCAR O BEBÊ OU
OBJETOS, COMO MAMADEIRA**

**MÃE COM SUSPEITA DE COVID-19: USAR
MÁSCARA FACIAL NO MOMENTO DA
AMAMENTAÇÃO**



**NÃO É RECOMENDADO QUE SE SUSPENDA O
ALEITAMENTO MATERNO**

**ESSAS MEDIDAS NOS AJUDAM A PREVENIR CONTRA O
CORONAVÍRUS, MAS TAMBÉM NOS PROTEGEM CONTRA O
MEDO E AS FALSAS NOTÍCIAS!**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



- 1.** Brasil. Ministério da Saúde. Manual Aidpi Criança: 2 meses a 5 anos [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância. - Brasília: Ministério da Saúde, 2017
- 2.** SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Aleitamento Materno. O aleitamento materno nos tempo de COVID-19. Março, 2020.
- 3.** SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento científico de neonatologia. Prevenção e abordagem da infecção por COVID- 19 em mães e Recém- nascidos, em Hospitais- Maternidades. Março, 2020.
- 4.** SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento científico de neonatologia. Recomendações para Cuidados e assistência ao Recém-Nascido com suspeita ou diagnóstico de COVID - 19. Março, 2020.
- 5.** SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Grupo Executivo Nacional de Reanimação Neontal. Recomendações para assistência ao Recém-Nascido na sala de parto de mãe com COVID-19 suspeita ou confirmada. Março, 2020.
- 6.** SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento científico de cardiologia da sociedade Brasileira de Pediatria. A criança nos tempos de COVID- 19: posicionamento oficial conjunto. Março, 2020.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO A RESPEITO DA INFECÇÃO PELO SARS- COV-2 (COVID-19) EM RECÉM- NASCIDOS E CRIANÇAS

PRODUÇÃO:

VIVIANE SANTOS FERREIRA

Acadêmica do 8º período de Medicina -
Universidade Federal do Amazonas

ORIENTAÇÃO:

DRª. ADRIANA TAVORA A. TAVEIRA

Gastroenterologia e Hepatologia
Pediátrica

Professora Adjunta de Pediatria -
Universidade Federal do Amazonas

